

Karta produktu

MicroSpeed® Energy

Nawóz specjalnego przeznaczenia zawierający 2 g/l IRC (1-(2-methoxyethyl)-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl) urea) i 320 g/l kwasu pidolowego



Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

- 33,3%** Materii organicznej
- 35%** Suchej masy
- 3,4%** Azotu całkowitego (N)
- 3,4%** Azotu mocznikowego (N-NH₂)
- 0,4%** Fosforu (P) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych
- 2%** Tlenku potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

Postać:

Roztwór

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1110 g/l
pH 2,5-3,5

Instrukcje dotyczące stosowania:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędnione (odwodnione) rośliny. Nie przekraczać dawki. **PRZED UŻYCIEM WYMIESZAĆ.**

Nawóz można stosować z większością fungicydów, insektycydów i nawozami dolistnymi z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. W przypadku wątpliwości co do zgodności, zaleca się przeprowadzenie próby w oddzielnym naczyniu. MicroSpeed® Energy należy dodać do zbiornika opryskiwacza jako pierwszy. Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

Zalecenia stosowania:

Rośliny uprawne	Dawka [l/ha]	Ilość wody	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża ozime	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).
Zboża jare	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy pełni krzewienia do końca fazy liścia flagowego (BBCH 25-39).
Rzepak	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy 8 liści do fazy żółtego pąka; w fazie rozwoju tuszczyn (BBCH 18-59; 70-79).
Kukurydza	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy 3 liści do fazy 8 liści (BBCH 13-18).
Ziemniaki	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 12-69).
Buraki cukrowe	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy 2 liści do fazy dojrzałości technologicznej (BBCH 12-49).
Bobowate	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy 3 liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).
Stonecznik	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy 8 liści do fazy kwitnienia (BBCH 18-65).
Warzywa	0,2-0,25	100-300		W okresie intensywnego wzrostu.
Drzewa i krzewy owocowe	0,5	500-800	2	Od fazy rozwoju liści do końca fazy przyrostu masy owoców (BBCH 10-79).
Owoce miękkie	0,2-0,25	100-300	2	Od fazy rozwoju liści do fazy dojrzewania owoców (BBCH 10-81).
Użytki zielone	0,2-0,25	100-300	2	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, lekarzem.

UFI: AX76-P0W8-S003-CJ4F

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i nienastłonecznionym. Chronić przed mrozem. Temperatura przechowywania 5°C do 30 °C.

Informacje dodatkowe:

Wprowadzony do obrotu na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. z późn. zm.

Kraj pierwszego wprowadzenia do obrotu: Estonia. Numer pozwolenia: 2646

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l

Producent:

CALDENNA Sp. z o.o. sp. k.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.

