

## Karta produktu

### Agravita® Aktiv 48 Plus

Nawóz organiczno-mineralny

Synergistyczny nawóz wielofunkcyjny



#### Skład w % (m/m):

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 10,6%  | Azot całkowity (N)                                                           |
| 5%     | Azot w postaci azotu azotanowego (N-NO <sub>3</sub> )                        |
| 5%     | Azot w postaci azotu amonowego (N-NH <sub>4</sub> )                          |
| 22%    | Pięciotlenek fosforu (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) rozpuszczalny w wodzie |
| 22%    | Tlenek potasu (K <sub>2</sub> O) rozpuszczalny w wodzie                      |
| 2%     | Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie                                  |
| 0,02%  | Bor (B) rozpuszczalny w wodzie                                               |
| 0,05%  | Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie                    |
| 0,10%  | Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie                   |
| 0,05%  | Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie                   |
| 0,001% | Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie                                         |
| 0,05%  | Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie                     |
| 40,5%  | Całkowita materia organiczna                                                 |
| 22,7%  | Węgiel organiczny (C <sub>org.</sub> )                                       |
| 4%     | Kwasy fulwowe                                                                |
| 0,01%  | Kinetyna                                                                     |
| 0,02%  | Kwasy giberelinowe                                                           |
| 1%     | Aminokwasy ogółem                                                            |

#### Postać:

Proszek.

#### Instrukcje dotyczące stosowania:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprężu i końcówek umożliwiających uzyskanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu.

Nie należy wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne ani na podwędnięte (odwodnione) rośliny.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Nawóz można stosować z większością fungycydów, insektycydów i nawozów dolistnych, przestrzegając ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. W przypadku wątpliwości co do zgodności, zaleca się przeprowadzenie próby w oddzielnym naczyniu.

Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

CALDENA Sp. z o.o. sp. k.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnów, Poland

Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000

[www.caldena.com](http://www.caldena.com)

Karta produktu Agravita Aktiv 48 Plus

Data sporządzenia: 04.12.2024

strona 1/3

## Zalecenia stosowania:

| Nawożenie dolistne      |               |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rośliny uprawne         | Dawka [kg/ha] | Ilość wody [l/ha] | Liczba zabiegów | Termin stosowania                                                                                                                                                                                                   |
| Zboża                   | 0,5           | 200               | 2-3             | Jesienią w przypadku opóźnionych siewów i słabego krzewienia. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego.                                                                                        |
| Rzepak                  | 0,5           | 200               | 2-3             | Jesienią w fazie 2-4 liści (szczególnie w przypadku opóźnionych siewów, nierównomiernego wzrostu, słabej kondycji, uszkodzeń herbicydowych). Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy wydłużania pędu głównego. |
| Kukurydza               | 0,5           | 200               | 2               | Od fazy 2 liści do fazy 7 liści.                                                                                                                                                                                    |
| Ziemniaki               | 0,5           | 200               | 1-2             | Od pełnych wschodów do fazy tworzenia się pędów.                                                                                                                                                                    |
| Buraki cukrowe          | 0,5           | 200               | 2-3             | Od fazy 2 liści do zakrycia międzyrzędzi.                                                                                                                                                                           |
| Bobowate                | 0,5           | 200               | 1-2             | Od wschodów do początku fazy kwitnienia.                                                                                                                                                                            |
| Tytoń                   |               | 300               | 2               | Po przyjęciu się rozsady. Następnie po 14 dniach.                                                                                                                                                                   |
| Warzywa                 | 0,5           | 200               | 2-4             | W fazie intensywnego wzrostu i nie później niż 14 dni przed zbiorem.                                                                                                                                                |
| Truskawki i maliny      | 0,5           | 500               | 3               | Po ruszeniu wiosennej wegetacji. Następnie co 14 dni.                                                                                                                                                               |
| Drzewa i krzewy owocowe | 0,5-0,7       | 500-1000          | 2               | Faza pąkowania. Następnie w okresie wzrostu owoców.                                                                                                                                                                 |
| Użytki zielone          | 0,5           | 200               | 2-3             | Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do połowy września – 7-10 dni, po każdym pokosie/ wypasie.                                                                                                                  |

| Zaprawianie     |                        |                                     |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Rośliny uprawne | Dawka                  | Zalecenia                           |
| Zboża           | 0,25-0,3 kg/1 t nasion | Można stosować łącznie z zaprawami. |
| Ziemniaki       | 0,3-0,6 kg/1 t bulw    |                                     |
| Warzywa         | 0,5-1,0 kg/1 t nasion  |                                     |

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Nawóz może być szkodliwy dla zdrowia w przypadku poćknięcia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu lub błon śluzowych, należy przemyć je dużą ilością wody. Przy długotrwałej pracy z nawozem należy używać rękawic ochronnych. W przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. Chronić przed dziećmi.

## Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed wilgocią, ponieważ pod jej wpływem produkt może ulec zbryleniu.

## Okres przydatności do stosowania:

5 lat od daty produkcji, zachowując zalecane warunki przechowywania. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.

**Podstawa prawna wprowadzania do obrotu:**

art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.  
Kraj pierwszego wprowadzenia do obrotu: Estonia.  
Numer pozwolenia: 2647

**Dostępne opakowania:**

2 kg, 5 kg

**Producent:**

CALDENА sp. z o.o. sp. k.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



Zeskanuj kod QR